





Πίνακας 1. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2015*

Εμβόλιο ▼	Ηλικία ►	Γέννηση	1 μηνός	2 μηνών	4 μηνών	6 μηνών	12 μηνών	15 μηνών	18 μηνών	19-23 μηνών	2-3 ετών	4-6 ετών	7-10 ετών	11-12 ετών	13-15 ετών	16-18 ετών	
Ηπατίτιδας Β (γέννηση) (HepB) ¹		HepB	HepB		HepB	HepB 3 ή 4 δόσεις				HepB							
HepB όταν δεν γίνει στη γέννηση ¹				HepB	HepB	HepB 3 δόσεις				HepB							
Διφθερίτιδας, Τετάνου, ακυτταρικό Κοκκύτη (DTaP <7 ετών, Tdap ≥ 7 ετών) ²				DTaP	DTaP	DTaP	DTaP	DTaP		DTaP	DTaP	DTaP	Tdap-IPV	Tdap-IPV	Tdap-IPV		
Αιμόφιλου ινφλουέντζας τύπου b (Hib) ³				Hib	Hib	Hib	Hib	Hib		Hib			Hib				
Πολιομυελίτιδας αδρανοποιημένο (IPV) ⁴				IPV	IPV	IPV				IPV	IPV	IPV					
Πνευμονιόκοκκου συζευγμένο (PCV13) ⁵				PCV13	PCV13	PCV13	PCV13		PCV13			PCV13					
Πνευμονιόκοκκου πολυσακχ/κό (PPSV23) ⁵												PPSV23					
Μηνιγγιτιδόκοκκου συζευγμένο (MCC, MCV4) ⁶							MCC 1 δόση	MCC 1 δόση						MCV4 1 δόση	MCV4 1 δόση		
Ιλαράς, Παρωτίτιδας, Ερυθράς (MMR) ⁷							MMR 1 ^η δόση		MMR		MMR 2 ^η	MMR					
Ανεμευλογιάς (VAR) ⁸							VAR 1 ^η δόση		VAR		VAR 2 ^η	VAR					
Ηπατίτιδας Α (HepA) ⁹							HepA 2 δόσεις				HepA						
Ιού ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) ¹⁰														HPV 2 δόσεις		HPV 3 δόσεις	
Φυματίωσης (BCG) ¹¹		BCG					Mantoux					BCG	BCG				
Γρίπης ¹²							Ετησίως σε ομάδες υψηλού κινδύνου										
Ρότα ιού (RV) ¹³				RV1 ή RV5	RV1 ή RV5	RV5											

* Τα πολυδύναμα εμβόλια πρέπει να προτιμώνται των ολιγοδυνάμων. Το εμβόλιο κάτω από τη διακεκομμένη γραμμή συνιστάται, αλλά συνταγογραφείται με συμμετοχή

-  Συστήνονται για όλα τα άτομα με την ανάλογη ηλικία που δεν έχουν ένδειξη ανοσίας
-  Συστήνονται σε άτομα που καθυστέρησαν να εμβολιαστούν
-  Συστήνονται σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου (βλέπε . ομάδες αυξημένου κινδύνου)
-  Δεν συστήνονται